2. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de Φ_1 et d

3. Résoudre $P_1(x) < P_2(x)$.

$$\underline{m-1} \quad \underline{-4m} \quad \underline{+m-60} \\ = -2m-61$$

4. Etudier la position relative de Φ_1 et d

Exercice n° 4

$$P_m(x) = (m-1)x^2 - 4mx + m - 60 \text{ où } m \text{ est un nombre réel.}$$

1. On étudie le cas où $m = 1$. Déterminer les racines de P_1 $-4x-59=0$ donc $x=-59/4$

2. On suppose désormais que $m \neq 1$. Dans chacun des cas, déterminer la ou les valeurs de m telle(s) que :

- a. 1 est une racine de P_m . On remplace x par 1 $-2m-61=0$ $m=-61/2$
- b. P_m a une seule racine.

~~P_m n'admet pas de racine réelle
 a. pour tout x , $(m-1)x^2 - 4mx + m - 60 < 0$.~~

Exercice n° 5

Soit $m \in \mathbb{R}$. C_m est la courbe représentative de la fonction polynôme définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_m(x) = x^2 + (3-m)x + 1 \quad a=1 \quad b=3-m \quad \text{et} \quad c=1$$

- 1. Déterminer pour quelles valeurs de m , l'équation $f_m(x) = 0$ a exactement une solution réelle.
- 2. Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de m , l'équation $f_m(x) = 0$ a exactement deux solutions réelles.

1. $\Delta=0$ donc $(3-m)^2-4=0$ donc $m^2-6m+5=0$ $\Delta = 16$ $m_1=1$ $m_2=5$

2. $\Delta > 0$ donc $m^2-6m+5 > 0$

tableau de signes

m	-∞	1	5	+∞
	+	⊖	⊖	+

$m < 1$ ou $m > 5$

deg	360°	180°	90°	60°	45°	30°	270°	
rad	2pi	pi $\uparrow$	pi/2	pi/3	pi/4	pi/6	3pi/2	

Note: A blue arrow labeled 'x 3' points from the 30° column to the 270° column. Another blue arrow points from the pi/2 row to the 3pi/2 column.

$$\frac{3\pi}{2} = 3 \times \frac{\pi}{2}$$

Placer sur le cercle trigonométrique les images des réels suivants

$$\frac{\pi}{2} ; \pi ; \frac{\pi}{3} ; \frac{2\pi}{3} ; 2\pi ; \frac{\pi}{6} ; 0 ; -\frac{\pi}{4}$$

$$-\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} ; \frac{3\pi}{4} ; -\pi ; -\frac{\pi}{6} ; 51\pi ; \frac{11\pi}{6}$$

$\pi/2 \rightarrow 90^\circ$

$-\pi/2 = 3\pi/2$ (2pi) (se lit modulo 2pi)